
BIO-SHS

VACINA CONTRA A SÍNDROME DA CABEÇA INCHADA DAS AVES

INATIVADA E MICRO EMULSIONADA

USO VETERINÁRIO

INDICAÇÃO:

Prevenção da Síndrome da Cabeça Inchada em galinhas reprodutoras (matrizes) leves e pesadas.

Modo de Usar:

- A vacina é administrada por via intramuscular no músculo do peito, na dose de 0,5 mL, utilizando agulha 10 x 10 ou 10 x 8. Recomenda-se trocar a agulha a cada 500 aves.
- A melhor época para aplicação de BIO-SHS às aves é às 17 semanas de idade, entretanto, em casos especiais poderão ser indicadas duas vacinações, sendo a 1ª entre 8 e 10 semanas de idade e a 2ª entre 14 e 16 semanas de idade.
- O uso da vacina, todavia, pode ser modificado a critério do Médico Veterinário responsável pela aplicação.

IMPORTANTE:

- A inoculação acidental de vacina oleosa, no homem, pode causar séria reação local. O serviço médico deverá ser advertido imediatamente e informado de que se trata de vacina em emulsão oleosa.
- Somente vacinar aves saudáveis.
- Não vacinar nos 21 dias que antecedem o abate.
- Conservar o produto entre 2°C e 8°C.
- Não congelar o produto.
- No momento da aplicação o produto deverá estar entre 20°C e 30°C a fim de facilitar sua utilização.
- Agitar antes e durante o uso. Uma vez aberto o frasco, a vacina não se conserva.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

COMPOSIÇÃO:

Cada dose do produto contém suspensão inativada de pneumovírus aviário amostras SHS 119/95-BR e TRT-217/00-BR, com título mínimo antes da inativação $\geq 10^{5.1}$ DICT₅₀/dose.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Lic. no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 7929 em 11/09/01.

Resp. Téc. Méd. Vet.:

Dr. Danillo Silva Marcon

CRMV/SP 36.982

Proprietário/Fabricante:

Laboratório Bio-Vet Ltda.

R. Cel. José Nunes dos Santos, 639

06730-000 - Vargem Grande Paulista - SP

CNPJ 60.411.527/0001-30

INDÚSTRIA BRASILEIRA
